

**Danmarks sikreste  
middel imod ukrudt i  
majs – nogensinde**

**MaiSTER**



# Ukrudtsbekæmpelse i majs i 2009

- ◆ At **græsukrudt** skal bekæmpes i Majs
- ◆ At **snerlepileurt** skal bekæmpes på **kimbladstadiet**.
- ◆ At første sprøjtning skal udføres på ukrudtets kimbladstadie
- ◆ At **intervallerne** mellem sprøjtningerne max må være 14 dage
- ◆ **MaisTer skal med mindst en gang i alle majsmarker!**



# Kan vi undvære MaisTer?



Led 5

14/5 2009. st. 12  
0,5L Callistro

29/5 2009. st. 15  
0,5L Callistro + 0,4L Fighter 480 +  
0,5L Renol

FORSØGSVIRKSOMHEDEN "YTTEBORG"  
Hjemvej 94 - 7560 Hjerrn  
Tlf. 96 12 11 00 - Fax 96 12 11 09

# MaisTer kan også storkenæb




"st 11 50 g MaisTer + 11 g Harmony + 0,3 l Starane  
st 15 50 g MaisTer + 11 g Harmony  
+ 0,3 l Starane"

st 11 50 g MaisT  
+ 0,3 l Starane  
st 15 50 g MaisTer  
+ 0,3 l Starane

st 11 75 g MaisTer  
+ 0,3 l Starane  
st 15 75 g MaisTer  
+ 0,3 l Starane

St 11 0,75 l Callisto  
st 15 0,75 l Callisto

st11 0,5 l Callisto  
st 15 0,5 l Callisto



# Standard løsning



**Ukrudt  
kimblade**

**+ 12 – 14 dage**

**0,5 ltr Callisto  
+ 0,3 ltr Starane/  
0,5 VOP Harmony**

**50-75 g  
Maister**

**+ 0,3 ltr Starane  
Fighter tildeles  
efter behov**

**Evt 3. sprøjtning mod nyfremspiret  
ukrudt – Maister/Callisto/Starane**

**Ved rodukrudt foretrækkes Callisto**



**Fremspiring**



**Bayer CropScience**

# Vanskelige arter + brakmarker



**Ukrudt  
kimblade**

**+ 10-14 dage**

**+ 10-14 dage**

**0,5 ltr Callisto +  
0,3 ltr Starane/  
0,5 VOP Harmony**

**40-50 g  
Maister**

**I blanding m  
(0,3 ltr Starane)  
Fighter iblandes  
efter behov**

**100-110 g  
Maister**

**I blanding m  
0,5 ltr Callisto  
/ 0,3 ltr Starane**

Ved rodukrudt foretrækkes Callisto  
sammen med Maister



**Fremspiring**



**Til og med 8 blade**



**Bayer CropScience**